

6.11.2

MAMMIFÈRES (MAMMALIA) NON-VOLANTS

DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA

DEOCLÉCIO DE QUEIRÓZ GUERRA

ALFREDO LANGGUTH



Tamandua tetradactyla (Fourmilier à collier).

Au Brésil, on connaît actuellement 701 espèces de mammifères réparties en 243 genres, 50 familles et 12 ordres (PAGLIA et al., 2012). A Pedra Talhada, sans prendre en compte les chauves-souris, on a recensé 21 espèces, dont 3 marsupiaux, 6 rongeurs, 3 Pilosa (fourmiliers et paresseux), 2 Cingulata (tatous), 6 carnivores et 1 primate.

La plupart des mammifères ont des mœurs nocturnes ou crépusculaires et jouent un rôle important dans la chaîne alimentaire et la dispersion des diaspores. Ce sont des espèces arboricoles ou terrestres et, à part les primates qui sont diurnes, elles sont en général difficiles à observer. Leur présence dans la Réserve est attestée par des spécimens conservés dans des collections scientifiques et par des photographies.


Ce travail est une compilation des recensements réalisés dans la Réserve Biologique de Pedra Talhada (Réserve)(états d'Alagoas et de Pernambuco) au cours des années 1995, 1996 et 2009 par D. Guerra et d'autres chercheurs du Département de Zoologie de l'Université Fédérale de Pernambuco, ainsi qu'en 1999 par A. Langguth et ses collaborateurs du Département de Systématique et d'Ecologie de l'Université Fédérale de Paraíba (Sousa et al., 2004). Sont ajoutées à cette liste les espèces observées et photographiées dans la Réserve par d'autres chercheurs dont l'identification peut être garantie sans besoin de capturer l'animal (photographies d'Anita Studer, Luis Batista de Freitas, Felino Pedro Celestino, Laurent Godé et Christian Willig).

Il s'agit là d'un inventaire partiel (voir inventaire XXV). Des études complémentaires s'avèrent nécessaires pour avoir une meilleure connaissance de la faune des mammifères de cette Réserve qui constitue, pour beaucoup d'espèces, un des ultimes refuges dans cette région. Les groupes ci-après sont énumérés selon la classification de WESTHEIDE & RIEGER (2009). Les photos de ce chapitre illustrent des individus de la Réserve, exception faite de celles marquées d'un astérisque (*) qui représentent des animaux de la même espèce, présente à Pedra Talhada, mais photographiées dans d'autres régions du Brésil.

& BIANCONI, 2011). Omnivores et opportunistes, ils se rencontrent dans une grande variété de milieux mais surtout dans les reliques boisées, y-compris dans les villes et dans les parcs et jardins. Ils sont solitaires et principalement nocturnes (ALESSIO et al., 2003). Dans la Réserve, les *Didelphis* sont les petits mammifères les plus opportunistes et les plus généralistes. Ils transportent leurs petits dans le marsupium, poche ventrale typique des marsupiaux. (6.11.2.1, 6.11.2.2, 6.11.2.3).



6.11.2.1. *Didelphis albiventris* (Opossum à oreilles blanches) sur un arbre.



6.11.2.2. *Didelphis albiventris* (Opossum à oreilles blanches) caché dans un arbre creux.

MARSUPIAUX (ORDRE MARSUPIALIA)

Famille des Didelphidae

Didelphis albiventris (Lund, 1840)

Opossum à oreilles blanches | Cassaco

Les Opossums à oreilles blanches ont une large distribution géographique au Brésil. Ce sont des animaux de taille moyenne, pesant de 500 à 2750 g (Rossi



6.11.2.3. *Didelphis albiventris* (Opossum à oreilles blanches) jeunes dans le nid.

Micoureus demerarae (Thomas, 1905)
Souris-opossum laineuse | Cuíca

Micoureus demerarae est un didelphidé de taille moyenne, à large répartition, pesant de 90 à 150 g. Il est classé comme insectivore-omnivore (PAGLIA et al., 2012). Son pelage est dense et laineux, dans les tons brunâtres, plus clair sur le dos, et plus orangé sur les flancs et les parties latérales de la tête. Cette dernière est gris-orangé avec des yeux cerclés de noir (6.11.2.4). Le ventre est de couleur crème-jaunâtre. La queue est velue sur 1/6 de sa longueur, près du corps, et nue dans la partie distale qui est de couleur grise rayée de blanc. Cette espèce ne possédant pas de poche marsupiale, ses petits restent accrochés aux mamelles de la mère (OLIVEIRA & LANGGUTH, 2004).



6.11.2.4. *Micoureus demerarae* (Souris-opossum laineuse).

Marmosa murina (Linnaeus, 1758)
Opossum nain | Cuíca-pequena

C'est un opossum de petite taille. La tête et le corps mesurent environ 122 mm, le tout étant plus court que la longue queue. Les oreilles sont de la même couleur que le dos. Les yeux sont entourés d'une grande tache sombre allongée. Les joues sont de couleur crème et la partie en-dessous des oreilles, orangée. Le pelage est fin et doux, gris à gris-brunâtre sur le dos. Le ventre est de couleur crème ou rose-saumon. La queue est brune. Le pied est court et large (6.11.2.5, 6.11.2.6). L'Opossum nain se nourrit d'arthropodes et de fruits, se déplaçant aussi bien à terre que dans les arbres. Cette espèce ne possède pas non plus de poche marsupiale et ses petits restent fermement accrochés aux mamelles de leur mère.



6.11.2.5. *Marmosa murina* (Opossum nain), avec ses petits accrochés aux mamelles.



6.11.2.6. *Marmosa murina* (Opossum nain).

TATOUS (ORDRE CINGULATA)

Famille des Dasypodidae

Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758)

Tatou à six bandes | Tatu-peba

Tatou de taille moyenne, mesurant, tête et corps, 45 cm. La carapace est composée de 6 à 7 rangées de bandes de plaques mobiles. La tête est large, triangulaire et plate. Les oreilles sont bien séparées. La coloration générale de la carapace est d'un jaune sale (6.11.2.7). Les membres ont chacun 5 doigts armés de puissantes griffes que l'animal utilise pour creuser son terrier et déterrer sa nourriture (6.11.2.8). Il est omnivore et terrestre.



6.11.2.7. *Euphractus sexcinctus* (Tatou à six bandes).



6.11.2.8. *Euphractus sexcinctus* (Tatou à six bandes), entrée du terrier.

Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758)

Tatou à neuf bandes | Tatu-verdadeiro

Cette espèce de taille moyenne mesure, tête et corps, 38 cm. Son corps est recouvert d'une carapace flexible avec, en son milieu, 8 à 10 bandes de plaques mobiles (6.11.2.9). La tête étroite, allongée et conique est recouverte d'un petit bouclier de plaques semblables à celles du corps. Les oreilles sont grandes et rapprochées l'une de l'autre. La patte antérieure a 4 doigts et la postérieure 5, tous armés de fortes griffes que l'animal utilise pour creuser son terrier et déterrer sa nourriture. Le dos est châtain foncé et les flancs, jaunes. La peau du ventre est également jaune, parsemée de poils durs et blancs. Le Tatou à neuf bandes est omnivore-insectivore et de mœurs terrestres. Il creuse de profonds terriers pour se protéger des prédateurs.



6.11.2.9. *Dasypus novemcinctus* (Tatou à neuf bandes).

FOURMILIERS ET PARESSEUX (ORDRE PILOSA)

Famille des *Myrmecophagidae*

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758)

Fourmilier à collier | Tamanduá-mirim

Ce fourmilier est de taille moyenne, mesurant, tête et corps, 50 cm. La tête est conique avec un long museau ouvert seulement à la pointe d'où sort sa longue langue qui lui sert à capturer les insectes. Les oreilles sont saillantes sur les côtés. La patte antérieure a 4 doigts armés de griffes puissantes que l'animal utilise pour grimper aux arbres et chercher sa nourriture. La queue, préhensile, est jaunâtre et nue dans sa partie distale. Le pelage est court sur la tête, le cou et les membres, et plus fourni sur le reste du corps et sur la queue (6.11.2.10, 6.11.2.11). Deux bandes sombres se rejoignent sur les épaules, formant un collier noir. Il est arboricole et insectivore.



6.11.2.10. *Tamandua tetradactyla* (Fourmilier à collier), deux individus sur un arbre.



6.11.2.11. *Tamandua tetradactyla* (Fourmilier à collier), adulte avec un jeune sur le dos.

Famille des Cyclopedidae

Cyclopes didactylus (Linnaeus, 1758)
Fourmilier nain | Tamandú-aí

C'est le plus petit représentant des fourmiliers, avec un corps et une tête mesurant au total 18 cm. Sa tête est petite, son museau court et de forme conique. Les membres antérieurs sont un peu plus courts que les postérieurs. La main a 2 doigts, l'un plus développé que l'autre, tous deux armés d'une forte griffe. Le pied en a 4. La fourrure, très jolie, laineuse, soyeuse et dense, recouvre entièrement le corps de l'animal excepté l'extrémité du museau où les poils sont courts, ainsi que le dessous de l'extrémité de la queue, préhensile, qui est dépourvue de poils. Le pelage est doré, tacheté de châtain, avec une bande sombre le long du milieu du dos (6.11.2.12, 6.11.2.13). La distribution de cette espèce va du Venezuela au Nordeste du Brésil. Le Fourmilier nain est totalement arboricole et se nourrit d'insectes qu'il capture avec sa longue langue.



6.11.2.12. *Cyclopes didactylus* (Fourmilier nain), sur un arbre.



6.11.2.13. *Cyclopes didactylus* (Fourmilier nain), dormant sur un arbre.

Famille des Bradypodidae

Bradypus variegatus (Schinz, 1825)
Paresseux à trois doigts, aï | Preguiça-de-três-dedos

Espèce de taille moyenne mesurant 50 cm, tête et corps. Sa fourrure est longue et rêche, châtain-grisâtre, avec des taches blanc sale sur tout le corps. Les mâles ont une région du pelage de couleur noire bordée de jaune au milieu du dos. Les femelles ne présentent pas ce caractère. Les pattes portent chacune 3 doigts armés de fortes griffes recourbées de même taille, que l'animal utilise pour grimper (6.11.2.14, 6.11.2.15). Les membres antérieurs sont plus grands que les postérieurs. Les oreilles sont dissimulées sous la fourrure. Les yeux sont entourés d'un masque noir qui se prolonge vers l'arrière par deux bandes faciales latérales. La queue est courte. Le Paresseux à trois doigts, ou aï, est arboricole et se nourrit de feuilles.



6.11.2.14. *Bradypus variegatus* (Paresseux à trois doigts), sur un arbre.



6.11.2.15. *Bradypus variegatus* (Paresseux à trois doigts), adulte et jeune.

RONGEURS (ORDRE RODENTIA)

Famille des Muridae

Hylaeamys oniscus (Thomas, 1904)
Rato-da-mata

Rat de taille moyenne mesurant 14 cm pour la tête et le corps, avec une queue de longueur plus ou moins égale. Le dos, du museau à la base de la queue, est brun rougeâtre, un peu grisâtre, plus jaunâtre sur les flancs. Sur le côté, la couleur du dos est nettement délimitée de celle du ventre qui varie du grisâtre au blanc sale. L'arrière du museau et le dessous de la joue sont de couleur gris clair (6.11.2.16). Le dessous de la queue est plus clair. Le pied est grand avec le dessus blanc grisâtre et de longs poils autour des griffes. Cette espèce est terrestre et vit à l'intérieur de la forêt. Elle se nourrit de fruits et de graines qu'elle trouve sur le sol.



6.11.2.16. **Hylaeamys oniscus* (Rato-da-mata).

Nectomys squamipes (Brants, 1827)
Rato-d'água

Muridé de grande taille par rapport aux autres représentants de la famille. La queue est plus longue que l'ensemble tête-corps. L'adulte pèse environ 400 g. Le corps est de couleur châtain. Les pattes postérieures sont robustes, palmées, adaptées à la natation (6.11.2.17). Ayant une large distribution géographique, il vit surtout à proximité des cours d'eau. Il se nourrit de poissons, de champignons, de fruits, de graines et d'arthropodes (OLIVEIRA & BONVICINO, 2011).



6.11.2.17. **Nectomys squamipes* (Rato-d'água).

Oligoryzomys stramineus Bonvicino & Weksler, 1998
Ratinho-de-rabo-comprido

Pesant entre 9 et 40 g, ce rat de petite taille a une queue plus longue que le corps (6.11.2.18). Le dos est châtain-jaunâtre. Ses pieds sont étroits. Animal terrestre, il se trouve dans tous les milieux naturels du Brésil, aussi bien dans les forêts que dans les zones ouvertes.



6.11.2.18. **Oligoryzomys stramineus* (Ratinho-de-rabo-comprido).

Famille des Caviidae

Galea spixii (Wagler, 1831)
Cobaye à dents jaunes de Spix | Preá

De taille moyenne, l'adulte pèse environ 600 g. La queue courte est presque invisible. Le dos varie du grisâtre au gris-jaunâtre et le ventre est blanc ou blanc-jaunâtre (6.11.2.19). Le pourtour des yeux est cerclé d'une ligne blanche. Cette espèce est terrestre

et diurne. Bien que son habitat normal soit la caatinga, on le rencontre dans les aires déboisées des forêts ombrophiles submontagnardes (*Brejo de Altitude*).



6.11.2.19. **Galea spixii* (Cobaye à dents jaunes de Spix).

Famille des Cuniculidae

Cuniculus paca (Linnaeus, 1758)
Agouti paca | Paca

C'est une espèce de grande taille, avec un corps massif et robuste, une tête grande et large et des pattes relativement courtes (6.11.2.20). Le poids d'un adulte varie entre 9,2 et 9,5 kg. Le dos est châtain-foncé ou châtain-rougeâtre. Les flancs, typiques, sont marqués de rangées de taches blanches formant parfois des lignes continues. Les doigts sont allongés. Il y en a 4 sur les pattes antérieures. Les pattes postérieures en ont 5, les 3 du milieu étant pourvus de fortes griffes émoussées et les 2 latéraux étant réduits. La queue est presque invisible.



6.11.2.20. *Cuniculus paca* (Agouti paca).

Cet animal terrestre se nourrit de fruits tombés au sol, de pousses et de tubercules. Il vit à proximité des cours d'eau. Il est très apprécié pour sa chair, ce qui en fait une proie de choix pour les chasseurs.

Famille des Erethizontidae

Coendou (Sphiggurus) speratus Mendes-Pontes, Gadelha, Melo, Sá, Loss, Caldara, Costa & Leite, 2013
Coendou | Cuandu-mirim

Espèce de petite taille densément recouverte de piquants. Le museau, bulbeux, de couleur rose (chez l'animal vivant) est couvert de poils courts. Les oreilles sont courtes, larges, arrondies et couvertes de poils courts. Les piquants dorsaux, de la tête jusqu'au milieu du corps, sont généralement tricolores. Il peut y avoir, entre les piquants, des poils épars courts et grisâtres. La région ventrale est couverte d'un pelage doux. Les membres antérieurs et postérieurs sont couverts de poils fins et souples (6.11.2.21, 6.11.2.22). Les pattes antérieures et postérieures sont adaptées aux déplacements dans les arbres grâce à de longues griffes recourbées et à des coussinets plantaires. La queue préhensile, pouvant se diriger vers le haut, est plus courte que la longueur tête-corps. Le dessus de la moitié proximale de la queue est couvert de piquants qui disparaissent sur la moitié distale. Exclusivement arboricole, il se nourrit de fruits et de fragments de végétaux. Le Coendou est endémique du Nordeste du Brésil (le centre de l'endémisme étant l'Etat de Pernambuco). Il est présent dans les reliques de Forêt Atlantique de l'Etat de Pernambuco et a été observé dans la Réserve de Pedra Talhada par Anita Studer, Christian Willig et Laurent Godé (comm. pers.). Il est endémique d'une région qui est menacée par les braconniers et l'exploitation agricole (Reis et al., 2014).



6.11.2.21. *Coendou speratus* (Coendou).



6.11.2.22. *Coendou speratus* (Coendou).

PRIMATES (ORDRE PRIMATES)

Famille des Cebidae

Callithrix jacchus (Linnaeus, 1758)
Ouistiti à toupets blancs | Sagui

Le Ouistiti à toupets blancs est un petit singe pesant de 300 à 360 g. Les touffes de poils blancs autour des oreilles sont caractéristiques de l'espèce (6.11.2.23, 6.11.2.24). Le front porte une tache blanche transversale au-dessus des yeux. Sur le dos, le pelage est long et doux, marqué de quatre bandes transversales caractéristiques. La couleur générale est grisâtre avec de l'orange ou du jaune. La queue est cerclée d'anneaux sombres alternant avec d'étroites bandes plus claires, ce qui lui donne un aspect général grisâtre. C'est une espèce commune dans la Caatinga et la Forêt Atlantique du Nordeste brésilien, au nord du Rio São Francisco. Ils forment des groupes allant de 3 à 15 individus qui, de manière communautaire, portant indifféremment leurs progénitures sur le dos. Les Ouistitis à toupets blancs sont diurnes et arboricoles. Ils se nourrissent de fruits, d'insectes, de nectar et d'exsudats végétaux (gommes, résines et latex). Ils peuvent également manger des fleurs, des graines, des œufs d'oiseaux et des petits vertébrés.



6.11.2.23. **Callithrix jacchus* (Ouistiti à toupets blancs).

CARNIVORES (ORDRE CARNIVORA)

Famille des Mustelidae

Eira barbara (Linnaeus, 1758)
Martre à tête grise | Papa-mel

La Martre à tête grise est un animal de taille moyenne pesant entre 3,7 et 11,1 kg. Le corps est allongé, les membres courts et la queue longue. Le corps est brun foncé, devenant plus sombre vers la queue (6.11.2.25). La tête et le cou sont généralement d'un brun plus clair. Ce sont des animaux qui vivent en solitaires ou en couples et dont l'activité est surtout diurne. Ils se nourrissent principalement de petits vertébrés, de fruits, de canne à sucre et de miel (CHEIDA et al., 2011). On peut les observer tant au sol que dans les arbres.



6.11.2.25. **Eira barbara* (Martre à tête grise).

Galictis cuja (Molina, 1782)
Petit grison | Furão

Carnivore de petite taille au corps svelte et aux pattes courtes. Tête et corps mesurent 30 cm. La tête est tricolore : noire sur le devant, avec une ligne jaunâtre ou blanchâtre sur le front et grisâtre vers l'arrière (6.11.2.26). Le pelage est grisâtre sur le dos et tout noir au-dessous. Les oreilles sont petites et arrondies. La queue est couverte de longs poils de la même couleur que le dos. Il est carnivore et vit à terre, gîtant dans des trous ou dans des cavités d'arbres creux tombés sur le sol forestier.



6.11.2.24. **Callithrix jacchus* (Ouistiti à toupets blancs).



6.11.2.26. *Galictis cuja* (Petit grison).



6.11.2.28. *Nasua nasua* (Coati commun), grimpant sur un arbre.

Famille des Procyonidae

Nasua nasua (Linnaeus, 1766)
Coati commun | Quati

Le Coati commun est une espèce de taille moyenne, pesant entre 2,7 et 10 kg. Elle est présente dans tous les milieux naturels du Brésil. Elle se différencie des autres membres de la famille par une tête large qui se prolonge par un museau long, étroit, très saillant, pointu et très mobile (6.11.2.27, 6.11.2.28, 6.11.2.29)(CHEIDA et al., 2011). La couleur du dos varie du brun-foncé au brun-jaunâtre. Il y a trois taches blanches autour de chaque œil : une au-dessus, une au-dessous et une de côté, entre l'œil et l'oreille. La queue est cerclée par des anneaux bruns foncés ou noirs alternant avec des anneaux jaunâtres ou rougeâtres. Le coati se déplace en bandes. Il est omnivore et arboricole. (FEIJÓ & LANGGUTH, 2013).



6.11.2.27. *Nasua nasua* (Coati commun).



6.11.2.29. *Nasua nasua* (Coati commun), jeune.

Potos flavus (Schreber, 1774)
Kinkajou | Juparã

Le Kinkajou est une espèce de taille moyenne mesurant 42 cm, tête et corps compris. Il a un museau court, de grands yeux et une tête arrondie. Son pelage est dense et doux (6.11.2.30). Le dos, les pattes et la queue sont jaune-brunâtres ou dorés (FEIJÓ & LANGGUTH, 2013).

Il se nourrit principalement de fruits et de petits vertébrés. Il peut varier son régime alimentaire selon la saison, le complétant d'insectes, de fleurs et de feuilles. Nocturne et arboricole, c'est un important agent de dispersion des graines (CHEIDA et al., 2011). La queue est longue, densément velue et préhensile.



6.11.2.30. **Potos flavus* (Kinkajou), individu malade.

Procyon cancrivorus (Cuvier, 1798)
Raton crabier | Guaxinim, Mão-pelada

Le Raton crabier est un mammifère de taille moyenne pesant, pour un individu adulte, près de 10 kg (6.11.2.31). Sa coloration générale est grisâtre, avec un masque autour des yeux et une queue annelée. Espèce généraliste, elle est assez commune dans les milieux forestiers de même que dans les champs de canne à sucre. C'est un animal solitaire et nocturne, vivant généralement dans les forêts proches des marais, des rivières et dans les mangroves. Il se nourrit de mollusques, d'insectes, de poissons, de crabes, d'amphibiens, de reptiles, de petits rongeurs et de fruits (CHEIDA et al., 2011). Un de ses noms populaires brésiliens « mão-pelada » (main nue) fait référence à ses pattes antérieures aux longs doigts dépourvus de poils, que l'animal utilise pour « laver » sa nourriture.



6.11.2.31. *Procyon cancrivorus* (Raton crabier).

Lorsqu'il marche, le Raton crabier appuie toute la surface plantaire de ses pattes sur le sol, laissant les empreintes caractéristiques de l'espèce sur les substrats boueux, argileux ou sablonneux.

Famille des Canidae

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)
Renard des savannes, Petit loup | Cachorro-do-mato, Raposinha

Parmi les carnivores de la région, cette espèce de renard est de taille moyenne, mesurant 56 cm, tête et corps compris. Dos, tête et corps sont grisâtres. Les poils de la tête sont courts. Généralement, on distingue, au milieu du dos, une zone plus sombre qui s'étend du cou jusqu'à la naissance de la queue. Les oreilles sont arrondies à l'extrémité, de couleur châtain foncé et rougeâtres à la base (6.11.2.32). Les flancs ont une couleur gris-jaunâtre qui passe graduellement au jaunâtre ou au blanchâtre sur le ventre. La limite entre le châtain-foncé du menton et le jaune-crème de la gorge est mal définie. La queue, noire à l'extrémité, est couverte de longs poils de la même couleur que ceux du dos. Parfois une ligne dorsale noire continue parcourt toute la longueur de l'animal. Ce petit renard est présent dans tout le *Nordeste*. Strictement terrestre, c'est un bon marcheur qui peut parcourir de grandes distances. Il est omnivore se nourrissant d'autres vertébrés plus petits et de fruits. Perdant parfois ses réflexes de prudence et peu farouche, l'animal peut être observé jusque dans les espaces verts à l'intérieur des villes.



6.11.2.32. *Cerdocyon thous* (Renard des savannes, Petit loup).

REMERCIEMENTS

Aux biologistes et amis Artur Galileu Coelho, Alexandre Malta, Camila Bione et Cibele R. Bonvicino pour leurs contributions photographiques, ainsi qu'Anita Studer, Luis Batista de Freitas, Felino Pedro Celestino, Laurent Godé et Christian Willig. Aux remarquables guides naturalistes et de terrain Felino Pedro Celestino, Luis Batista de Freitas, Manoel Nunes de Farias (Dema) et Manoel Nazario (Mané). A François Dunant pour l'identification du Petit-grison. A Mário Ferreira da Silva, guide de terrain et taxidermiste du département de zoologie de l'Université Fédérale de Pernambuco (UFPE). A Nicolas Spitznagel pour la conception et la réalisation graphique. A l'ICMBio (*Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade*) et à l'IBAMA (*Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis*) pour leur aide et pour les autorisations de recherche. A l'Association Nordeste Reforestation et Education pour le financement et l'aide au cours des missions de terrain et pour l'hébergement. A Rodolphe Spichiger et Mathieu Chardet pour la traduction.

ADRESSES DES AUTEURS

DEOCLÉCIO DE QUEIRÓZ GUERRA, Centro de Ciências, Biológicas, Departamento de Zoologia, Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. CEP 50670-420, Recife, PE, Brasil
biodguerra@yahoo.com.br

ALFREDO LANGGUTH, Departamento de Sistemática e Ecologia, Universidade Federal da Paraíba, 58059-900, João Pessoa, PB, Brasil
boninomvd@hotmail.com

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ALESSIO, F. M., E. C. S. GOMES, S. R. A. SANTOS & A. R. M. PONTES, 2003. *Didelphis albiventris* (Mammalia, Marsupialia): comensal de ambientes urbanos e sobrevivente da fragmentação da Mata Atlântica em Pernambuco. In: *VI Congresso de Ecologia do Brasil. Fortaleza*. Resumos. 237-239. Fortaleza.

CHEIDA, C. C., E. NAKANO-OLIVEIRA, R. FUSCO-COSTA, F. ROCHA-MENDES & J. QUADROS. Ordem Carnivora. In: REIS, N. R., A. L. PERACCHI, W. A. PEDRO & I. P. LIMA (org.) 2011. *Mamíferos do Brasil*. 235-288. Universidade Estadual de Londrina. Londrina.

FEIJÓ, A. & A. LANGGUTH. 2013. Mamíferos de Médio e Grande Porte do Nordeste do Brasil: Distribuição e Taxonomia com Descrição de Novas Espécies. *Revista Nordestina de Biologia* 22(1-2): 3-225.

OLIVEIRA, J. A. & C. R. BONVICINO. 2011. Ordem Rodentia. In: REIS, N. R., A. L. PERACCHI, W. A. PEDRO & I. P. LIMA. (org.). *Mamíferos do Brasil*. 359-415. Universidade Estadual de Londrina. Londrina.

OLIVEIRA, F. F. & A. LANGGUTH. 2004. Pequenos mamíferos (Didelphimorphia e Rodentia) de Paraíba e Pernambuco, Brasil. *Revista Nordestina de Biologia* 18(2): 19-86.

PAGLIA, A. P., G. A. B. DA FONSECA, A. B. RYLANDS, G. HERRMANN, L. M. S. AGUIAR, A. G. CHIARELLO, Y. L. R. LEITE, L. P. COSTA, S. SICILIANO, M. C. M. KIERULFF, S. L. MENDES, V. DA C. TAVARES, R. A. MITTERMEIER & J. L. PATTON 2012. Lista Anotada dos Mamíferos do Brasil 2ª Edição/Annotated Checklist of Brazilian Mammals. *Occasional Papers in Conservation Biology* 6: 1-76.

PONTES, A. R. M., J. R. GADELHA, E. R. A. MELO, F. B. DE SA, A. C. LOSS, V. CALDARA JUNIOR, L. P. COSTA & Y. L. R. LEITE. 2013. A new species of porcupine, genus *Coendou* (Rodentia: Erethizontidae) from the Atlantic forest of northeastern Brazil. *Zootaxa* 3636: 421-438.

REIS, N. R., M. N. FREGONEZI, A. L. PERACCHI, O. A. SHIBATTA, E. R. SARTORE, B. K. ROSSANEIS, V. R. SANTOS & P. FERRACIOLI. 2014. *Mamíferos Terrestres de Médio e Grande Porte da Mata Atlântica*. 1ª ed: 1-146. Technical Books Editora. Rio de Janeiro.

ROSSI, R. V. & G. V. BIANCONI. 2011. Ordem Didelphimorphia. In: REIS, N. R., A. L. PERACCHI, W. A. PEDRO & I. P. LIMA. (org.). *Mamíferos do Brasil*. 31-69. Universidade Estadual de Londrina. Londrina.

SOUSA, M. A. N., A. LANGGUTH & E. D. A. GIMENEZ. 2004. Mamíferos dos Brejos de Altitude em Paraíba e Pernambuco. 229-254. In: PORTO, K. C., J. J. P. CABRAL & M. TABARELLI (eds.). *Brejos de Altitude em Pernambuco e Paraíba: Historia Natural, Ecologia e Conservação*. MMA, Brasília.

WESTHEIDE, W. & G. RIEGER 2009. *Spezielle Zoologie, Teil 2: Wirbel- oder Schädeltiere*: 1-173. Springer-Spektrum, Berlin-Heidelberg.

**INVENTAIRE
DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE
DE PEDRA TALHADA**

XXV

**MAMMIFÈRES (MAMMALIA)
NON-VOLANTS**

DEOCLÉCIO DE QUEIRÓZ GUERRA

ALFREDO LANGGUTH

ADRESSES DES AUTEURS

DEOCLÉCIO DE QUEIRÓZ GUERRA, Departamento de Zoologia, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil
biodguerra@yahoo.com.br

ALFREDO LANGGUTH, Departamento de Sistemática e Ecologia, Universidade Federal da Paraíba, 58059-900, João Pessoa, PB, Brasil
boninomvd@hotmail.com

INVENTAIRE

La liste suivante énumère les 21 espèces de mammifères non-volants recensées dans la Réserve Biologique de Pedra Talhada (Réserve). En se basant sur d'autres inventaires réalisés dans la région du *Nordeste*, on a évalué la diversité des mammifères à 128 espèces dont 53 chauves-souris, 35 petits rongeurs et marsupiaux, et 40 autres espèces de mammifères de taille moyenne à grande, c'est-à-dire, des chiffres bien supérieurs à ceux obtenus à ce jour dans la Réserve. On peut donc émettre l'hypothèse que des études plus approfondies à Pedra Talhada donneraient un nombre d'espèces plus important que celui de l'inventaire ci-dessous. Les espèces sont regroupées par ordre alphabétique d'**Ordre**, **Famille**, **Genre** et **espèce**. Les spécimens-témoins sont déposés dans les collections de mammifères des instituts de recherches désignés par des acronymes et des numéros au-dessous du nom d'espèce (UFPE : Université Fédérale de Pernambuco, UFPB : Université Fédérale de Paraíba). Les noms vernaculaires sont signalés. Toutes les espèces illustrées proviennent de la Réserve de Pedra Talhada, sauf certains spécimens qui ont été photographiés dans d'autres régions du *Nordeste* brésilien afin de fournir la meilleure iconographie possible. Dans ce cas elles sont marquées d'un astérisque (*).

758

Didelphimorphia (Marsupialia)

Didelphidae

Didelphis albiventris (Lund, 1840)

UFPE 2842; UFPE 2851; UFPE 2898; UFPE 2899; UFPE 2903; UFPE 2904

Marmosa murina (Linnaeus, 1758)

Micoureus demerarae (Thomas, 1905)

UFPE 1350; UFPE 2978

Nom vernaculaire (français | portugais)

Opossum à oreilles blanches | Cassaco

Opossum nain | Cuíca-pequena

Souris-opossum laineuse | Cuíca

Cingulata

Dasypodidae

- Dasyus novemcinctus* (Linnaeus, 1758)
Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758)
- Tatou à neuf bandes | Tatu-verdadeiro
Tatou à six bandes | Tatu-peba

Pilosa

Myrmecophagidae

- Tamandua tetradactyla* (Linnaeus, 1758)
- Fourmilier à collier | Tamanduá-mirim

Cyclopedidae

- Cyclopes didactylus* (Linnaeus, 1758)
- Fourmilier nain | Tamanduá-í

Bradypodidae

- Bradypus variegatus* (Schinz, 1825)
- Paresseux à trois doigts, aï | Preguiça-de-três-dedos

Rodentia

Muridae

- Hylaeamys oniscus* (Thomas, 1904)
UFPB 3775
- Rato-da-mata

- Nectomys squamipes* (Brants, 1827)
UFPE 1349; UFPE 1358
- Rato d'água

- Oligoryzomys stramineus* Bonvicino & Weksler, 1998
UFPB 3790
- Ratinho-de-rabo-comprido

Caviidae

- Galea spixii* (Wagler, 1831)
UFPB 3776
- Cobaye à dents jaunes de Spix | Preá

Cuniculidae

- Cuniculus paca* (Linnaeus, 1758)
UFPB 4097
- Agouti paca | Paca

Erethizontidae

- Coendou (Sphiggurus) speratus* Mendes-Pontes,
Gadelha, Melo, Sá, Loss, Caldara, Costa e Leite, 2013
- Coendou | Cuandu-mirim

Primates

Cebidae

- Callithrix jacchus* (Linnaeus, 1758)
UFPB 5257
- Ouistiti à toupets blancs | Sagui

Carnivora

Mustelidae

- Eira barbara* (Linnaeus, 1758)
UFPB 3564
- Martre à tête grise | Papa-mel

Galictis cuja (Molina, 1782)

Procyonidae

Nasua nasua (Linnaeus, 1766)
UFPB 3566

Potos flavus (Schreber, 1774)
UFPB 3565

Procyon cancrivorus (Cuvier, 1798)
UFPB 4098

Canidae

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)

Petit grison | Furão

Coati commun | Quati

Kinkajou | Jupará

Raton crabier | Guaxinim, Mão pelada

Renard des savannes, Petit loup | Cachorro-do-mato, Raposinha

DIDELPHIMORPHIA



Didelphidae *Didelphis albiventris*



Didelphidae *Marmosa murina*



Didelphidae *Micoureus demerarae*

760

CINGULATA



Dasypodidae *Dasypus novemcinctus*




Dasypodidae *Euphractus sexcinctus*

PILOSA



Cyclopedidae *Cyclopes didactylus*



Bradypodidae *Bradypus variegatus*

RODENTIA



Muridae **Hylaeamys oniscus*



Muridae **Nectomys squamipes*



Muridae **Oligoryzomys stramineus*



Caviidae **Galea spixii*



Cuniculidae *Cuniculus paca*



Erethizontidae *Coendou (Sphiggurus) speratus*




Cebidae **Callithrix jacchus*



Mustelidae **Eira barbara*



Mustelidae *Galictis cuja*



Procyonidae *Nasua nasua*



Procyonidae **Potos flavus*



Procyonidae *Procyon cancrivorus*



Canidae *Cerdocyon thous*